



Les essences des jardins
thérapeutiques

Microcosme

Une architecture pour les jeunes personnes atteintes de démence
Les essences des jardins thérapeutiques

Lausanne
Juillet 2022
Alison Blank et Kilian Cossali

Table des matières

<i>Avant-propos</i>	p. 15
<i>Lexique</i>	p. 23
<i>Arboretum</i>	p. 29
Abies alba	p. 31
Alnus glutinosa	p. 33
Amelanchier ovalis	p. 35
Betula pendula	p. 37
Cornus mas	p. 39
Corylus avellana	p. 41
Cydonia oblonga	p. 43
Fagus sylvatica	p. 45
Fraxinus excelsior	p. 47
Larix europaea	p. 49
Malus domestica	p. 51
Olea europaea	p. 53
Pinus sylvestris	p. 55
Populus tremula	p. 57
Prunus avium	p. 59
Prunus domestica	p. 61
Pyrus communis	p. 63
Quercus robur	p. 65
Salix alba	p. 67
Sorbus domestica	p. 69
Sorbus torminalis	p. 71
<i>Herbier</i>	p. 73
<i>Plantes hautes</i>	p. 73
Angelica sylvestris	p. 75
Anthriscus sylvestris	p. 77

Astragalus glycyphyllos	p. 79
Brassica nigra	p. 81
Calamintha nepeta	p. 83
Calluna vulgaris	p. 85
Calystegia sepium	p. 87
Campanula rapunculus	p. 89
Carum carvi	p. 91
Cirsium oleraceum	p. 93
Epilobium angustifolium	p. 95
Eupatorium cannabinum	p. 97
Filipendula ulmaria	p. 99
Gentiana lutea	p. 101
Heracleum sphondylium	p. 103
Humulus lupulus	p. 105
Isatis tinctoria	p. 107
Lathyrus sylvestris	p. 109
Lilium martagon	p. 111
Lunaria rediviva	p. 113
Malva sylvestris	p. 115
Melilotus officinalis	p. 117
Orchis purpurea	p. 119
Origanum vulgare	p. 121
Ornithogalum pyrenaicum	p. 123
Phleum pratense	p. 125
Polygonum bistorta	p. 127
Ribes alpinum	p. 129
Salvia pratensis	p. 131
Scirpus sylvaticus	p. 133
Silene latifolia	p. 135
Solidago virgaurea	p. 137
Tragopogon pratensis	p. 139
Valeriana officinalis	p. 141
Verbascum thapsus	p. 143

Vicia cracca	p. 145
<i>Plantes basses</i>	p. 147
Alchemilla vulgaris	p. 149
Allium schoenoprasum	p. 151
Allium ursinum	p. 153
Borago officinalis	p. 155
Cardamine pratensis	p. 157
Chenopodium bonus-henricus	p. 159
Crocus vernus	p. 161
Cymbalaria muralis	p. 163
Dactylorhiza maculata	p. 165
Fragaria vesca	p. 167
Galium odoratum	p. 169
Galium verum	p. 171
Hyacinthoides non-scripta	p. 173
Lamium galeobdolon	p. 175
Lavandula angustifolia	p. 177
Melittis melissophyllum	p. 179
Mentha arvensis	p. 181
Muscari botryoides	p. 183
Ophrys apifera	p. 185
Oxalis acetosella	p. 187
Phyteuma spicatum	p. 189
Plantago major	p. 191
Potentilla anserina	p. 193
Primula veris	p. 195
Primula vulgaris	p. 197
Pulmonaria officinalis	p. 199
Reseda lutea	p. 201
Sanguisorba minor	p. 203
Satureja montana	p. 205
Sempervivum tectorum	p. 207

Silene vulgaris	p. 209
Stellaria media	p. 211
Taraxacum officinale	p. 213
Teucrium scorodonia	p. 215
Thymus vulgaris	p. 217
Trifolium repens	p. 219
Vaccinium myrtillus	p. 221
Vaccinium vitis-idaea	p. 223
Vinca minor	p. 225
Viola odorata	p. 227
Viola tricolor	p. 229

Plantes aquatiques

Althaea officinalis	p. 231
Eriophorum angustifolium	p. 233
Lythrum salicaria	p. 235
Mentha aquatica	p. 237
Menyanthes trifoliata	p. 239
Nuphar lutea	p. 241
Nymphaea alba	p. 243
Phragmites australis	p. 245
Typha latifolia	p. 247
Veronica beccabunga	p. 249

Bibliographie et iconographie

	p. 251
--	--------

Avant-propos

« Mon grand-père a Alzheimer ». « Tu as perdu ton téléphone ? Cherche-le dans le frigo ». « Tu as oublié ? Alors tu as Alzheimer ! » Nous entendons souvent parler de démence, mais rarement lorsqu'il s'agit de jeunes personnes ; diagnostiquées avant même d'atteindre l'âge de la retraite. Pourtant, elles existent.

Les jeunes représentent près de 5% des personnes atteintes de démence diagnostiquées en Suisse. De manière générale, les démences restreignent les capacités cognitives : la perception de l'espace, l'adaptation à l'environnement, tout comme le sens de l'orientation, se voient modifiés et altérés. Toutefois, les jeunes personnes présentent des spécificités, par rapport à leurs aînés : une vie familiale et des relations sociales souvent préservées, une condition physique bien plus présente. Pourtant, aucune architecture, aucun habitat, ne leur est adapté.

Ainsi est née l'ambition de créer Microcosme, une résidence dédiée aux jeunes personnes atteintes de démence. Celle-ci s'implante à La Tour-de-Peilz sur un site jouté de terrains sportifs et à proximité de nombreux arrêts de transports publics. La résidence est analogue à un village où chaque trio d'unités rappelle l'image d'un quartier ; les unités, celle de petits immeubles ; les chambres, d'appartements. Une rue intérieure de déambulation et les deux jardins la bordant s'entrelacent, tissent et connectent finement le tout.

Le premier jardin – au cœur de la résidence et implanté sur une topographie douce – est pensé pour répondre avant tout aux besoins des habitants. Quant au second jardin – dans la prolongation du premier –, entourant et enlaçant le village, il est ouvert à quiconque souhaitant se délasser ou se ressourcer dans un cadre bucolique.

Les diverses essences végétales présentes sont réfléchies pour être comestibles et non épineuses afin de ne représenter aucun danger pour les habitants ; de manière analogue, la réflexion est également menée pour les principaux animaux de compagnies pouvant être accueilli – les chiens et les chats – ainsi que pour les chèvres de la résidence.

Les jardins portent une attention particulière sur la stimulation des cinq sens :

- L'ouïe : du chant des oiseaux vivants dans certains arbres au bruissement de plantes sous l'effet d'un souffle d'air, en passant par le

clapotis de l'eau d'une mare.

- La vue : de par les différentes formes et couleurs de végétation ainsi que leur évolution au fil des saisons ; la multitude de couleurs de fleurs ainsi que celles virevoltantes des papillons attirés par ces dernières.

- L'odorat : le doux parfum des plantes aromatiques et des fleurs.

- Le toucher : les diverses textures de plantes perçues autant avec les mains que les pieds ou encore au travers d'un souffle sur les akènes d'un pissenlit les faisant s'envoler.

- Le goût : au travers de la multitude de saveurs de fruits ou de feuilles.

Dans ce village d'un nouveau genre, habitants, familles, employés ainsi que toutes personnes extérieures, y trouvent leur place.

Bienvenue à la résidence. Bienvenue au village. Bienvenue à Microcosme !



Fig. 1: Schéma de répartition des arbres et autres plantes.

Arbres

- | | |
|-----|--------------------|
| 1. | Abies alba |
| 2. | Alnus glutinosa |
| 3. | Amelanchier ovalis |
| 4. | Betula pendula |
| 5. | Cornus mas |
| 6. | Corylus avellana |
| 7. | Cydonia oblonga |
| 8. | Fagus sylvatica |
| 9. | Fraxinus excelsior |
| 10. | Larix europaea |
| 11. | Malus domestica |
| 12. | Olea europaea |
| 13. | Pinus sylvestris |
| 14. | Populus tremula |
| 15. | Prunus avium |
| 16. | Prunus domestica |
| 17. | Pyrus communis |
| 18. | Quercus robur |
| 19. | Salix alba |
| 20. | Sorbus domestica |
| 21. | Sorbus torminalis |

Plantes

- | | |
|---|--------------------|
|  | Plantes hautes |
|  | Plantes basses |
|  | Plantes aquatiques |

Lexique

Indigénat :

Indigène : Espèce végétale croissant et vivant dans la région sans y avoir été importée par les activités humaines.

Archéophyte :

Espèce végétale exotique introduite par les activités humaines avant 1500 [date approximative à laquelle le Nouveau Monde est découvert], de manière intentionnelle ou non, et qui s'est établie à l'état sauvage.

Néophyte :

Espèce végétale exotique introduite par les activités humaines après 1500.

Croissance :**Rapide :**

Espèce végétale atteignant sa maturité en plusieurs semaines ou mois.

Normale :

Espèce végétale atteignant sa maturité en plusieurs mois ou années.

Lente :

Espèce végétale atteignant sa maturité en plusieurs années ou décennies.

Type de végétation :**Annuelle :**

Espèce végétale vivant une année ou moins.

Bisannuelle :

Espèce végétale dont le cycle de vie dure deux années.

Vivace :

Espèce végétale vivant plus de deux années.

Type de feuillage :**Caduc :**

Espèce végétale perdant son feuillage à l'automne.

Semi-persistant :

Espèce végétale conservant une partie de son feuillage toute l'année.

Persistant : Espèce végétale conservant son feuillage toute l'année.

Besoin en entretien :

Faible : Espèce végétale ne nécessitant aucun soin particulier.

Modéré : Espèce végétale nécessitant quelques soins particulier et un peu de pratique en jardinage.

Important : Espèce végétale nécessitant des soins importants et un savoir-faire en jardinage.

Besoin en eau :

Faible : Espèce végétale supportant bien la sécheresse.

Modéré : Espèce végétale nécessitant un apport d'eau avant que le sol ne sèche.

Important : Espèce végétale nécessitant un apport d'eau abondant et régulier.

Rusticité :

Faible : Espèce végétale craignant le froid.

Modérée : Espèce végétale ne craignant pas le froid mais nécessitant une protection contre le gel.

Importante : Espèce végétale résistante au gel.

Arboretum



Abies alba

Sapin

Fig. 2: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris: Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.74. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 10 mètres et plus
Largeur à maturité :	2 à 10 mètres
Forme :	Conique
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Vue :	Parure d'aiguilles vertes foncées en hiver.
Odorat :	« Aiguilles aromatiques au froissement (odeur d'agrumes) ¹ ».
Toucher :	« Aiguilles coriaces, arrondies au sommet ² ».
Goût :	« Jeunes pousses tendres acidulées, citronnées, amères ³ ».

Note

Les jeunes pousses peuvent être ajoutées aux salades.

¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *Reconnaître facilement les plantes : identifier, toucher, sentir, goûter*. Paris : Delachaux et Niestlé. Nouvelle édition. Botanique. p.46.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*



Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Fig. 3: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.128. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	4 à 8 mètres
Forme :	Conique
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Février à avril
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Ombre, mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits ⁴ .
Toucher :	« Feuilles collantes au toucher ⁵ ».

⁴ STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. Un jardin pour les oiseaux. In : *vogelwarte.ch* [en ligne]. [Consulté le 2 juillet 2022].

⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.70.



Amelanchier ovalis

Amélanchier

Fig. 4: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.212. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	2 à 3 mètres
Largeur à maturité :	2 mètres
Forme :	Élancée ou divergente
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Période de récolte :	Juillet à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits ⁶ .
Vue :	Écorce grise-rosée. Abondante parure de fleurs blanches au printemps. Baies bleues-noires en été. Feuillage rouge flamboyant à l'automne.
Odorat :	Fleurs parfumées au printemps.
Toucher :	« Jeunes feuilles couvertes d'un duvet laineux ⁷ ».
Goût :	« Fruits juteux, sucrés et aromatiques ⁸ ».


⁶ STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. *op.cit.*

⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.79.

⁸ *Ibid.*

Note

Les fruits se consomment crus ou cuits ; ils accompagnent parfaitement les viandes.



Betula pendula

Bouleau

Fig. 5: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.131. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	5 à 10 mètres et plus
Largeur à maturité :	3 à 7 mètres
Forme :	Arrondie ou tombante
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ⁹ .
Vue :	Écorce d'un blanc lumineux (aspect accentué en hiver).
Odorat :	« Jeunes feuilles d'odeur aromatique ¹⁰ ».
Toucher :	« Jeunes rameaux glabres, couverts de verrues et rudes au toucher ¹¹ ». Écorce particulièrement lisse.

⁹ Focus sur le jardin sensoriel, 2017. In : *jardin-thérapeutique.net* [en ligne]. [Consulté le 2 juillet 2022].

¹⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.71.

¹¹ *Ibid.*

¹² PROSPECIERARA, [s.d.]. La feuillée : sain et écologique. In : *ProSpecieRara* [en ligne]. [Consulté le 2 juillet 2022].

Note

Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins¹².



Cornus mas

Cornouiller mâle

Fig. 6: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.116. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	3 à 7 mètres
Largeur à maturité :	1.50 à 5 mètres
Forme :	Divergeante ou conique
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Février à avril
Période de récolte :	Octobre à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits ¹³ . Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Petites fleurs jaunes-dorées dès la fin de l'hiver. Fruits rouges et feuillage pourpre à l'automne.
Odorat :	« Fleurs légèrement odorantes ¹⁴ ».
Goût :	« Fruits acidulés, aromatiques ¹⁵ ».


Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote, en tarte ou en confiture.

¹³ STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. *op.cit.*

¹⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.64.

¹⁵ *Ibid.*



Corylus avellana

Noisetier

Fig. 7: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.136. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	2 à 5 mètres
Largeur à maturité :	3 à 5 mètres
Forme :	Buissonnante
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Janvier à mars
Période de récolte :	Juillet à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant ¹⁶ .
Toucher :	« Feuilles velues ¹⁷ ».

Notes

Les fruits attirent également de nombreuses espèces de petits rongeurs.
Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins¹⁸.

¹⁶ STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. *op.cit.*

¹⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.73.

¹⁸ PROSPECIERARA, [s.d.]. *op. cit.*



Cydonia oblonga

Cognassier

Fig. 8: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.153. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	5 à 8 mètres
Largeur à maturité :	3 à 5 mètres
Forme :	Buissonnante
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai
Période de récolte :	Septembre à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Toucher :	Feuillage et fruits pubescents
Goût :	Fruits juteux et aromatiques.

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote ou en confiture.



Fagus sylvatica

Hêtre

Fig. 9: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.157. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	10 à 20 mètres
Forme :	conique ou élancée
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à mai
Période de récolte :	Octobre à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Ombre, mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Toucher :	« Jeunes feuilles tendres, feuilles adultes à consistance de plastique souple ¹⁹ ».
Goût :	« Amandes des fruits de saveur douce ²⁰ ».

Note

Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins²¹.

¹⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.74.

²⁰ *Ibid.*

²¹ PROSPECIERARA, [s.d.]. *op. cit.*



Fraxinus excelsior

Frêne

Fig. 10: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.233. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	10 à 20 mètres
Forme :	Arrondie
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles


Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Toucher :	« Feuilles glabres en dessus, légèrement velues en dessous, bourgeons veloutés ²² ».

Note

Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins²³.

²² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.60.

²³ PROSPECIERARA, [s.d.]. *op. cit.*



Larix europaea

Mélèze

Fig. 11: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.85. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 10 mètres et plus
Largeur à maturité :	1 à 10 mètres
Forme :	Arrondie ou conique
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Vue :	Importante floraison jaune et rouge au printemps.
Odorat :	« Aiguilles aromatiques au froissement ²⁴ ».
Toucher :	« Aiguilles fines, molles ²⁵ ».
Goût :	« Jeunes pousses acidulées, citronnées ²⁶ ».

Notes

²⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.47.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ PROSPECIERARA, [s.d.]. *op. cit.*

Les jeunes pousses peuvent être ajoutées aux salades.

Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins²⁷.



Malus domestica

Pommier

Fig. 12: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.215. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Archéophyte
Hauteur à maturité :	3 à 10 mètres
Largeur à maturité :	4 à 7 mètres
Forme :	Divergeante
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Période de récolte :	Juillet à octobre
Besoin en entretien :	Modéré
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Abondante floraison blanche au printemps.
Odorat :	Fleurs à l'odeur suave.
Goût :	Fruits de saveur douce.

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote, en tarte ou en confiture.



Olea europaea

Olivier

Fig. 13: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.237. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	2 à 10 mètres
Largeur à maturité :	5 mètres
Forme :	Arrondie
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à juillet
Période de récolte :	Septembre à décembre
Besoin en entretien :	Modéré
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Feuillage vert-argenté. Écorce gris cendré, presque noir.
Toucher :	Écorce rugueuse.
Goût :	Fruits amers.



Pinus sylvestris

Pin Sylvestre

Fig. 14: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.100. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	6 à 20 mètres
Croissance :	Normale
Forme :	Arrondie, conique ou parasol
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux s'y abritant.
Vue :	Tronc orangé et aiguilles d'un vert bleuté.
Odorat :	« Aiguilles aromatiques au froissement, résine odorante ²⁸ ».
Toucher :	Écorce écailleuse.
Goût :	Jeunes pousses âpres et légèrement résineuses.

Notes

Les jeunes pousses peuvent être ajoutées aux salades.
Essence fourragère particulièrement appréciée des caprins²⁹.

²⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.48.

²⁹ PROSPECIERARA, [s.d.]. *op. cit.*



Populus tremula

Tremble

Fig. 15: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.279. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	5 à 10 mètres et plus
Largeur à maturité :	Jusqu'à 5 mètres
Forme :	Élancée
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à avril
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ³⁰ .
Toucher :	« Bourgeons un peu visqueux ; feuilles glabres, assez coriaces ³¹ ».

³⁰ Focus sur le jardin sensoriel, 2017. *op. cit.*

³¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.81.



Prunus avium

Merisier

Fig. 16: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.265. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	6 à 10 mètres
Forme :	Conique ou divergente
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à mai
Période de récolte :	Juin à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits ²⁶ . Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Abondante floraison blanche au printemps. Splendide feuillage rouge-orangé à l'automne.
Goût :	« Fruits de saveur douce ²⁷ ».

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits.

³² STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. *op.cit.*

³³ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.76.



Prunus domestica

Prunier

Fig. 17: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.240. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	3 à 8 mètres
Largeur à maturité :	3 à 4 mètres
Forme :	Divergeante
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à avril
Période de récolte :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Abondante floraison blanche au printemps.
Odorat :	Fleurs à l'odeur suave.
Goût :	Fruits de saveur douce.

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote, en tarte ou en confiture.



Pyrus communis

Poirier

Fig. 18: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.268. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques


Indigénat :	Archéophyte
Hauteur à maturité :	3 à 8 mètres
Largeur à maturité :	3 à 5 mètres
Forme :	Divergeante ou élancée
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à juin
Période de récolte :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Modéré
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Abondante floraison blanche au printemps.
Odorat :	Fleurs à l'odeur suave.
Goût :	Fruits de saveur douce.

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote, en tarte ou en confiture.



Quercus robur

Chêne pédonculé

Fig. 19: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.183. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	10 à 30 mètres
Forme :	Arrondie
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mars à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits.
Vue :	Arbre majestueux.
Toucher :	« Feuilles glabres ou un peu pubescentes en dessous sur les nervures ³⁴ ».
Goût :	Fruits amers et astringents.

³⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.74-75.



Salix alba

Saule blanc

Fig. 20: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.281. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	6 à 10 mètres et plus
Largeur à maturité :	5 à 15 mètres
Forme :	Arrondie ou tombante
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air.
Vue :	Feuillage tombant, vert clair avec reflets dorés.
Toucher :	« Rameaux flexibles, couverts de poils fins ; feuilles couvertes de longs poils soyeux ³⁵ ».

³⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.81.



Sorbus domestica

Cormier

Fig. 21: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.270. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	10 mètres et plus
Largeur à maturité :	6 à 8 mètres
Forme :	Élancée
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à juin
Période de récolte :	Septembre à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	« Feuilles cotonneuses sur leur face inférieure lorsqu'elles sont jeunes, glabres sur les deux faces une fois développées ³⁶ ».
Goût :	« Les fruits sont astringents, acides et amers ; une fois blets, ils deviennent mous, crémeux, aromatiques et très sucrés ³⁷ ».

Note

³⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.69.

³⁷ *Ibid.*

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en compote, en tarte ou en confiture.



Sorbus torminalis

Alisier torminal

Fig. 22: (ci-contre) LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *op. cit.* p.221. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	5 à 10 mètres
Largeur à maturité :	6 à 20 mètres
Forme :	Divergeante
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à juin
Période de récolte :	Septembre à décembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des fruits. Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Petites fleurs blanches au printemps. Baies marron et feuillage pourpre à l'automne.
Toucher :	« Feuilles glabres ³⁸ ».
Goût :	« Fruits acides et astringents ³⁹ ».

Note

Les fruits se consomment essentiellement en confiture.

³⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.78-79.

³⁹ *Ibid.*

Herbier
Plantes hautes



Angelica sylvestris

Angelica sylvestris

Fig. 23: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.8 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Bisannuelle
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à juillet
Période de récolte :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante aromatique au froissement, surtout les fruits et la racine ⁴⁰ ».
Vue :	Petites fleurs blanches groupées en grandes ombelles globuleuses. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁴¹ .
Toucher :	« Plante glabre ⁴² ».
Goût :	« Plante de saveur aromatique et amère ⁴³ ».

⁴⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp. 190-191.

⁴¹ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. Les papillons au jardin. In : *Andermatt biogarten* [en ligne]. [Consulté le 2 juillet 2022].

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Note

Toutes les parties de la plante peuvent être utilisées comme condiment.



Anthriscus sylvestris

Anthrisque sylvestre

Fig. 24: (ci-contre) HOFFMAN, L., 1883.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.2 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Période de récolte :	Mai à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	Odeur anisée au froissement.
Vue :	Petites fleurs blanches groupées en ombelles.
Toucher :	« Tige velue en bas, glabre en haut, fruits lisses ⁴⁴ ».
Goût :	Plante à saveur aromatique.

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.
Les graines peuvent être utilisées comme condiment.

⁴⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.196.



Astragalus glycyphyllos

Astragale à feuilles de réglisse

Fig. 25: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs d'un jaune verdâtre réunies en grappes ovales.
Goût :	« Les feuilles ont une saveur sucrée et amère de réglisse ⁴⁵ ».

⁴⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.199.



Brassica nigra

Moutarde noire

Fig. 26: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.5 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Annuelle
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à octobre
Période de récolte :	Janvier à décembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Toucher :	« Feuilles épaisses, couvertes de poils raides ⁴⁶ ».
Goût :	Toutes les parties de la plante ont une saveur piquante et âpre.

Note

Les feuilles et les inflorescences peuvent être consommées crues ou cuites.

⁴⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.212.



Calamintha nepeta

Calament népéta

Fig. 27: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1898.

Caractéristiques


Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 0.8 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante à forte odeur mentholée.
Vue :	Petites fleurs d'un rose lilas violacé réunies en petits groupes.
Toucher :	Plante légèrement velue.

Note

Les feuilles peuvent être utilisées comme condiment.



Calluna vulgaris

Callune

Fig. 28: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.8 mètre
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juillet à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs en clochettes d'un rose-mauve réunies en grappes.
Toucher :	« Feuilles épaisses, glabres ⁴⁷ ».

⁴⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.89.



Calystegia sepium

Liseron des haies

Fig. 29: (ci-contre) KOPS, Jan, 1814.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 5 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Plante grimpante. Magnifique floraison blanche et décorative.
-------	---



Campanula rapunculus

Campanule raiponce

Fig. 30: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1877.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.4 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mai à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs en clochettes d'un violet bleuté.
Goût :	« Racines et feuilles de saveur douce ⁴⁸ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.

⁴⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.196-197.



Carum carvi

Carvi

Fig. 31: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.8 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Période de récolte :	Juin à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Fruits dégageant au froissement une odeur aromatique d'agrumes ⁴⁹ ».
Vue :	Petites fleurs blanches réunies en ombelles au sommet des tiges.
Goût :	Plante à saveur citronnée et anisée.

Note

Les graines peuvent être utilisées comme condiment.

⁴⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.192.



Cirsium oleraceum

Cirse potager

Fig. 32: (ci-contre) LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1901.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.5 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs coniques, en forme de pompon.
Toucher :	« Plante glabre, feuilles molles ⁵⁰ ».
Goût :	« Feuilles de saveur douce, rappelant un peu l'artichaut ⁵¹ ».

Note

Les feuilles peuvent être mangées crues ou cuites.

⁵⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.180.

⁵¹ *Ibid.*



Epilobium angustifolium

Épilobe

Fig. 33: (ci-contre) *Epilobium angustifolium*, [s.d.].

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.5 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs d'un magnifique rose vif ou violettes, réunies en grappes.
Toucher :	Les fruits libèrent, à maturité, « de nombreuses graines munies d'une aigrette soyeuse ⁵² ».
Goût :	Toutes les parties de la plante sont astringentes.

⁵² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.250.



Eupatorium cannabinum

Eupatoire chanvrine

Fig. 34: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.5 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Tiges souvent rougeâtres. Fleurs roses groupées en corymbes denses au sommet des tiges. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁵³ .
Toucher :	« Plante velue, à poils mous, feuilles glanduleuses en dessous ⁵⁴ ».

⁵³ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*

⁵⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.160.



Filipendula ulmaria

Reine des prés

Fig. 35: (ci-contre) KOPS, Jan, HARTSEN, F. A., VAN EEDEN, F. W., 1868.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante


Stimulations sensorielles

Odorat :	« Les boutons floraux, les fleurs et les fruits sentent fortement l'amande amère lorsqu'on les froisse, les fleurs sont délicieusement odorantes par elles-mêmes ⁵⁵ ».
Vue :	Aspect plumeux des petites fleurs, blanc crème, réunies en grappes s'évasant vers le haut.
Goût :	Arôme d'amande amère et de vanille.

Note

Les feuilles, les fleurs et les fruits peuvent être utilisés pour parfumer des boissons ou des desserts.

⁵⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.106.



Gentiana lutea

Gentiane jaune

Fig. 36: (ci-contre) ÖHLER, Franz Eugen, Köhler's Mediziner-Pflanzen, 1897.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.8 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Grandes fleurs jaunes, au coeur de feuilles creuses.
Toucher :	« Plante [...] de toucher caoutchouteux ⁵⁶ ».
Goût :	« Plante de saveur amère, en particulier la racine, qui est très aromatique ⁵¹ ».

⁵⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.128-129.

⁵⁷ *Ibid.*



Heracleum sphondylium

Berce

Fig. 37: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1905.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.5 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante aromatique au froissement, tiges coupées à odeur de mandarine ⁵⁸ ».
Vue :	Fleurs blanches groupées au sommet des tiges en larges ombelles. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁵⁹ .
Toucher :	« Plante couverte de poils blanchâtres assez raides ⁶⁰ ».
Goût :	« Saveur aromatique ⁶¹ ».

⁵⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.193.

⁵⁹ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*



Humulus lupulus

Houblon

Fig. 38: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	Jusqu'à 5 mètres
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à septembre
Période de récolte :	Août à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles


Odorat :	Fleurs parfumées.
Vue :	Plante grimpante.
Toucher :	« Plante très rugueuse au toucher ⁶² ».
Goût :	« Pousses astringentes, légèrement amères et aromatiques ⁶³ ».

Note

Les jeunes pousses peuvent être consommées crues ou cuites.

⁶² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.110-111.

⁶³ *Ibid.*



Isatis tinctoria

Pastel

Fig. 39: (ci-contre) MASCLEF, Amédée, 1891.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.2 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mai à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	Plante légèrement velue.

Note

Les fleurs et les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.



Lathyrus sylvestris

Gesse sauvage

Fig. 40: (ci-contre) KOPS, Jan, 1846.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 2 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante


Stimulations sensorielles

Vue :	Plante grimpante. Grandes fleurs roses. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁶⁴ .
Goût :	Saveur douce.

Note

Les jeunes pousses peuvent être consommées crues ou cuites.

⁶⁴ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*



Lilium martagon

Lis martagon

Fig. 41: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.


Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs d'un rose violacé taché de pourpre.
Toucher :	« Tige et bord des feuilles un peu rugueux, feuilles caoutchouteuses, pétales charnues ⁶⁵ ».

⁶⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.128.



Lunaria rediviva

Lunaire vivace

Fig. 42: (ci-contre) STURM, Johann Georg, 1796.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Mai à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	Fleurs odorantes.
Vue :	Grandes fleurs aux veines violacées. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	Plante velue.
Goût :	« Plante de saveur plus ou moins piquante et amère ⁶⁶ ».

⁶⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.210.



Malva sylvestris

Mauve sylvestre

Fig. 43: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 1.2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs d'un rose pourpre aux nervures violacées.
Toucher :	« Feuilles molles, tendres ⁶⁷ ».
Goût :	« Feuilles et fleurs de saveur très douce, de texture mucilagineuse ⁶⁸ ».

Note

Les feuilles peuvent être consommées crues ou cuites.

⁶⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.246-247.

⁶⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.246-247.



Melilotus officinalis

Mélilot

Fig. 44: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 1.2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Bisannuelle
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante à l'odeur de vanille.
Vue :	Petites fleurs jaunes réunies en grappes allongées.

Note

Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées pour parfumer des sauces ou des desserts.



Orchis purpurea

Orchis pourpre

Fig. 45: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.8 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Grandes fleurs blanches tâchées de pourpre foncé.
Toucher :	« Plante glabre, feuilles caoutchouteuses au toucher ⁷¹ ».

⁶⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.118.



Origanum vulgare

Origan

Fig. 46: (ci-contre) KOPS, Jan, 1814. Flora Batava. Volume 3 (1814).

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante à odeur aromatique.
Vue :	Tiges rougeâtres et petites fleurs roses. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁷² .
Toucher :	Plante velue.
Goût :	Plante à saveur poivrée, piquante et légèrement amère.

Note

La plante peut être utilisée comme condiment.

⁷⁰ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*



Ornithogalum pyrenaicum

Aspergette

Fig. 47: (ci-contre) SMITH, Worthington
George, 1863-1880.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Petites fleurs d'un blanc verdâtre, en forme d'étoiles.
Toucher :	« Plante glabre ⁷¹ ».
Goût :	Saveur d'artichaut et de petits pois frais.

Note

Les jeunes pousses peuvent être consommées comme les asperges.

⁷¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.127.



Phleum pratense

Phléole

Fig. 48: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ⁷⁴ .
Vue :	Fleurs en épis cylindriques.



Polygonum bistorta

Bistorte

Fig. 49: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.4 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Ombre, mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air.
Vue :	Petites fleurs roses regroupées en un épi dense et allongé.
Toucher :	Plante légèrement velue.



Ribes alpinum

Groseiller des Alpes

Fig. 50: (ci-contre) REDOUTÉ, Pierre-Joseph, 1827.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 1.5 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à mai
Période de récolte :	Août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Petits fruits d'un rouge vif.
Toucher :	« Fruits glabres ⁷⁵ ».
Goût :	« Fruits de saveur fade, mucilagineux ⁷⁶ ».

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits.

⁷³ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.82-83.

⁷⁴ *Ibid.*



Salvia pratensis

Sauge des prés

Fig. 51: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Modérée

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Calices et partie supérieure de la tige à odeur aromatique ⁷⁷ ».
Vue :	Grandes fleurs d'un violet bleuté. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁷⁸ .
Toucher :	« Calices et partie supérieure de la tige, couverts de glandes, visqueux ⁷² ».

⁷⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.154.

⁷⁶ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*

⁷⁷ *Ibid.*



Scirpus sylvaticus

Scirpe

Fig. 52: (ci-contre) KOPS, Jan, 1877.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air.
Toucher :	« Feuilles rudes sur les bords ⁸⁰ ».
Goût :	« Feuilles de saveur très douce ⁸¹ ».

⁷⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.138.

⁷⁹ *Ibid.*



Silene latifolia

Compagnon blanc

Fig. 53: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1849.

Caractéristiques


Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Avril à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Fleurs légèrement odorantes la nuit ⁶⁹ ».
Vue :	Grandes fleurs blanches à calice allongé et renflé, groupées au sommet des tiges. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	« Plante velue, glanduleuse dans le haut ⁷⁰ ».

⁸⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.164.

⁸¹ *Ibid.*



Solidago virgaurea

Verge d'or

Fig. 54: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1905.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Fleurs d'un jaune doré regroupées en grappes.
Toucher :	Plante légèrement velue.



Tragopogon pratensis

Salsifis

Fig. 55: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1828.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.4 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Bisannuelle
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	« Akènes allongés, portant une aigrette plumeuse, formant une grosse boule duveteuse comme le pissenlit ⁸² ».
Toucher :	Les akènes s'envolent au moindre souffle d'air.
Goût :	« Boutons floraux tendres et sucrés ⁸³ ».

⁸² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.178.

⁸³ *Ibid.*



Valeriana officinalis

Valériane

Fig. 56: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Fleurs légèrement odorantes ⁸⁴ ».
Vue :	Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	Plante légèrement velue.
Goût :	« Feuilles de saveur amère ⁸⁵ ».

Note

Les chats affectionnent particulièrement son odeur.

⁸⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.168.

⁸⁵ *Ibid.*



Verbascum thapsus

Bouillon-blanc

Fig. 57: (ci-contre) KOPS, Jan, 1814.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.6 à 1.6 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juin à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère, en été. Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des graines, en hiver.
Vue :	Plante d'aspect cotonneux.
Toucher :	« Plante couverte de poils cotonneux blanchâtres, feutrés, denses et persistants ⁸⁶ ».

⁸⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.241.



Vicia cracca

Vesce cracca

Fig. 58: (ci-contre) REICHENBACH, L.,
REICHENBACH, H. G., 1903.

Caractéristiques


Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Annuelle
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs d'un violet bleuté réunies en grappes étroites et allongées.

Herbier

Plantes basses



Alchemilla vulgaris

Alchémille

Fig. 59: (ci-contre) LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1917-1926.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Petites fleurs d'un vert jaunâtre réunies en petits corymbes vers le sommet de la plante.
Toucher :	Feuilles contenant souvent une goutte d'eau en leur centre.
Goût :	« Feuilles de saveur astringente ⁸⁷ ».

Note

Les fleurs peuvent être utilisées dans la composition de bouquets de fleurs.

⁸⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.207.



Allium schoenoprasum

Ciboulette

Fig. 60: KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1849.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à août
Période de récolte :	Avril à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante dégageant au froissement une odeur d'ail caractéristique ⁸⁸ ».
Vue :	Fleurs roses en ombelles denses au sommet des tiges.
Goût :	Saveur aromatique.

Note

Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme condiment.

⁸⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.122.



Allium ursinum

Ail des ours

Fig. 61: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Période de récolte :	Avril à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles


Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante dégageant au froissement une odeur d'ail caractéristique ⁸⁹ ».
Vue :	Fleurs blanches en ombelles au sommet de la tige.
Toucher :	« Plante glabre, feuilles caoutchouteuses, assez minces et souples ⁹⁰ ».
Goût :	Saveur aromatique.

Note

Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme condiment.

⁸⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.122-123.

⁹⁰ *Ibid.*



Borago officinalis

Bourrache

Fig. 62: (ci-contre) KOPS, Jan, GEVERS
DEIJNOOT, P. M. E., HARTSEN, F. A., 1865.

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Annuelle
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Mars à novembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Modérée

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs d'un bleu intense, en forme d'étoiles.
Toucher :	Plante légèrement velue. Feuilles charnues.
Goût :	« Feuilles à goût de concombre, fleurs à saveur d'huître ⁹¹ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades ou aux soupes. Les fleurs peuvent être utilisées pour parfumer des boissons.

⁹¹ COUPLAN, François, illustrations par
DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.234-235.



Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Fig. 63: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.5 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Février à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Grandes fleurs d'un rose pâle réunies en grappes au sommet de la tige. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ⁸⁴ .
Toucher :	Plante glabre.
Goût :	« Feuilles, fleurs et graines de saveur très piquante ⁹³ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades ou être utilisées comme condiment.

⁹² ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*

⁹³ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.209.



Chenopodium bonus-henricus

Bon-Henri

Fig. 64: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.7 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Minuscules fleurs groupées en longs épis.
Toucher :	« Face inférieure des feuilles recouverte de poils globuleux, formant une couche sableuse donnant au toucher une sensation d'humidité ⁹⁴ ».

Note

Les feuilles peuvent être consommées crues ou cuites.

⁹⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.224-225.



Crocus vernus

Crocus

Fig. 65: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL,
Herman Christiaan, 1832.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Février à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Fleurs odorantes.
Vue :	Grandes fleurs violacées, blanches ou panachées de blanc et de violet.



Cymbalaria muralis

Cymbalaire

Fig. 66: (ci-contre) KOPS, Jan, 1807.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Nombreuses fleurs d'un violet pâle accrochées sur des tiges rampantes.



Dactylorhiza maculata

Orchis tacheté

Fig. 67: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1836.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Fleurs dégageant une odeur agréable ⁹⁷ ».
Vue :	Grandes fleurs blanches ou d'un rose violacé réunies en épi allongé.
Toucher :	« Plante glabre, feuilles caoutchouteuses au toucher ⁹⁶ ».

⁹⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.119.

⁹⁶ *Ibid.*



Fragaria vesca

Fraise des bois

Fig. 68: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à septembre
Période de récolte :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Faux-fruits d'un rouge vif.
Goût :	Faux-fruits doux et sucrés.

Note

Les jeunes feuilles peuvent être ajoutées aux salades.



Galium odoratum

Aspérule

Fig. 69: (ci-contre) STURM, Johann Georg, 1796.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à juillet
Période de récolte :	Avril à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Parfum de vanille et de foin coupé.
Vue :	Petites fleurs blanches d'un blanc pur et lumineux.
Toucher :	« Fruits couverts de poils crochus ⁹⁷ ».

Note

Toutes les parties de la plante peuvent être utilisées pour parfumer des sauces ou des boissons.

⁹⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.142.



Galium verum

Caille-lait

Fig. 70: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Fleurs à odeur de miel ⁹⁸ ».
Vue :	Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	« Fruits glabres et lisses ¹⁰⁰ ».

⁹⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.142-143.

⁹⁹ *Ibid.*



Hyacinthoides non-scripta

Jacinthe des bois

Fig. 71: (ci-contre) KOPS, Jan, 1807.


Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	Fleurs à l'odeur suave.
Vue :	Floraison spectaculaire de grandes fleurs d'un bleu vif, en cloches allongées.
Toucher :	« Plante glabre ¹⁰⁰ ».

¹⁰⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.131.



Lamium galeobdolon

Lamier jaune

Fig. 72: (ci-contre) STURM, Johann Georg, 1796.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Avril à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Odorat :	« Plante à forte odeur au froissement ¹⁰¹ ».
Vue :	Grandes fleurs jaunes ; feuilles d'un vert pâle presque argenté.
Toucher :	Plante légèrement velue.

¹⁰¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.147.



Lavandula angustifolia

Lavande vraie

Fig. 73: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Modérée

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante à l'odeur suave.
Vue :	Fleurs violacées réunies en épis. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ¹⁰² .
Toucher :	Feuilles légèrement velues.
Goût :	Saveur aromatique rappelant le romarin.

Note

Les sommités fleuries peuvent être utilisés pour parfumer des boissons ou des desserts.

¹⁰² ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*



Melittis melissophyllum

Mélite

Fig. 74: (ci-contre) DENNERT, E., 1911.

Caractéristiques


Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante dégageant au froissement une odeur prononcée de miel, de citronnelle et de foin fraîchement coupé.
Vue :	Grandes fleurs d'un rose vif ou d'un blanc tacheté de rose.
Toucher :	Plante velue.

Note

Les jeunes feuilles peuvent être ajoutées aux salades.



Mentha arvensis

Menthe des champs

Fig. 75: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1877.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à octobre
Période de récolte :	Mai à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante à odeur légère, très suave, un peu camphrée ¹⁰³ ».
Vue :	Petites fleurs roses groupées en nombreux verticilles compacts.
Toucher :	Plante velue.
Goût :	Plante à saveur mentholée et rafraichissante.

Note

Les feuilles peuvent être utilisées comme condiment.

¹⁰³ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.150-151.



Muscari botryoides

Muscari

Fig. 76: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1828.

Caractéristiques

Indigénat :	Archéotype
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mars à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Fleurs à odeur suave, plus ou moins marquée ¹⁰⁴ ».
Vue :	Petites fleurs d'un bleu sombre réunies en grappes.
Toucher :	« Plante glabre ¹⁰⁵ ».

¹⁰⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.130.

¹⁰⁵ *Ibid.*



Ophrys apifera

Ophrys abeille

Fig. 77: (ci-contre) CORREVON, Henry, 1899.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.5 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juillet
Besoin en entretien :	Modéré
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs comportant trois larges sépales roses ou blancs et possédant un grand labelle – d'un brun foncé tacheté de jaune et de pourpre – imitant le corps d'un bourdon.



Oxalis acetosella

Oxalis des bois

Fig. 78: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs blanches veinées de rose. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	« Plante couverte de poils mous ¹⁰⁶ ».
Goût :	« Plante de saveur acide ¹⁰⁷ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.

¹⁰⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.245.

¹⁰⁷ *Ibid.*



Phyteuma spicatum

Raiponce en épi

Fig. 79: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.7 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	« Fleurs blanc jaunâtre, parfois bleues, de forme très particulière, ébouriffées ; groupées en épis allongés à l'extrémité des tiges ¹⁰⁸ ».
Goût :	« Racines à chair légèrement sucrée, à latex piquant ; feuilles de saveur douce ¹⁰⁹ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.

¹⁰⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.197.

¹⁰⁹ *Ibid.*



Plantago major

Grand plantain

Fig. 80: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Feuilles dégageant au froissement une odeur de champignon.
Vue :	Grande feuilles ovales ; minuscules fleurs blanches réunies en épis cylindriques, minces et allongés.
Toucher :	Feuilles épaisses et fermes.
Goût :	« Feuilles légèrement amères, à goût de champignon ¹¹⁰ ».

Note

Les jeunes feuilles peuvent être ajoutées aux salades.

¹¹⁰ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.116.



Potentilla anserina

Potentille ansérine

Fig. 81: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mai à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Feuilles d'un vert argenté allongées et dentelées. Fleurs jaunes solitaires sur de longs pédoncules.
Toucher :	« Feuilles couvertes de longs poils soyeux ¹¹¹ ».

¹¹¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.204.



Primula veris

Primevère officinale

Fig. 82: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mars à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Fleurs d'odeur agréable, délicate ¹¹² ».
Vue :	Fleurs d'un jaune vif taché d'orange.
Toucher :	Plante légèrement velue.

Note

Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues ou cuites.

¹¹² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.140.



Primula vulgaris

Primevère acaule

Fig. 83: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1872.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Février à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Feuilles à odeur légèrement anisée.
Vue :	Grandes fleurs jaunes pâles sur tiges courtes regroupées en une ombelle.
Toucher :	« Feuilles glabres en dessus, velues en dessous ¹¹³ ».

Note

Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues ou cuites.

¹¹³ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.140-141.



Pulmonaria officinalis

Pulmonaire

Fig. 84: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.4 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mars à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Ombre, mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Feuilles d'un vert sombre ponctué de tâches blanches. Fleurs d'un bleu violacé réunies au sommet des tiges.
Toucher :	« Plante couverte de poils rudes ¹¹⁴ ».

¹¹⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.235.



Reseda lutea

Réséda

Fig. 85: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1846.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.7 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante dégageant une odeur suave et sucrée.
Vue :	Petites fleurs d'un jaune verdâtre réunies en grappes pointues.
Goût :	« Plante à saveur piquante de moutarde ¹¹⁵ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades ou être utilisées comme condiment.

¹¹⁵ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.215.



Sanguisorba minor

Pimprenelle

Fig. 86: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Petites fleurs d'un vert mêlé de pourpre.
Goût :	Plante à saveur de concombre avec une touche de noix.

Note

Les feuilles peuvent être utilisées comme condiment.



Satureja montana

Sarriette

Fig. 87: (ci-contre) STURM, Jacob, 1849.

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juillet à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante dégageant au froissement une odeur fortement aromatique ¹¹⁶ ».
Vue :	Petites fleurs blanches réunies en grappes allongées.
Toucher :	Feuilles coriaces.
Goût :	« Saveur aromatique et piquante ¹¹⁷ ».

Note

Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme condiment.

¹¹⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.93.

¹¹⁷ *Ibid.*



Sempervivum tectorum

Joubarbe

Fig. 88: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Feuilles allongées étroitement imbriquées en rosettes. Grandes fleurs d'un rose pâle réunies en panicule au sommet de la tige.
Toucher :	« Plante charnue, à poils longs et mous, feuilles glabres sur les faces ¹¹⁸ ».
Goût :	« Feuilles de saveur acidulée et astringente ¹¹⁹ ».

Note

Les feuilles peuvent être mastiquées pour s'hydrater.

¹¹⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.231.

¹¹⁹ *Ibid.*



Silene vulgaris

Silène enflé

Fig. 89: (ci-contre) KOPS, Jan, GEVERS
DEIJNOOT, P. M. E., 1853.


Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.5 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à juillet
Période de récolte :	Mai à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Feuilles allongées d'un vert bleuté. Petites fleurs blanches.
Toucher :	« Feuilles un peu caoutchouteuses au toucher ¹²⁰ ».
Goût :	Jeunes pousses à saveur sucrée de petits pois.

¹²⁰ COUPLAN, François, illustrations par
DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.164.



Stellaria media

Stellaire

Fig. 90: (ci-contre) MENTZ, August, 1917.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Bisannuelle
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Janvier à décembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Chants des nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des graines.
Vue :	Petites fleurs blanches en forme d'étoiles.
Goût :	Saveur de noisette.

Note

Toutes les parties de la plante peuvent être ajoutées aux salades.



Taraxacum officinale

Pissenlit

Fig. 91: (ci-contre) LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1901.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Akènes allongés, portant une aigrette plumeuse, formant une grosse boule duveteuse.
Toucher :	Les akènes s'envolent au moindre souffle d'air.
Goût :	« Feuilles développées de saveur amère ¹²¹ ».

Note

Les feuilles peuvent être consommées crues ou cuites.

¹²¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.174.



Teucrium scorodonia

Germandrée scorodoine

Fig. 92: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Plante dégageant au froissement une odeur forte rappelant un peu le fromage de chèvre ¹²² ».
Vue :	Fleurs jaunâtres groupées en longues grappes unilatérales à l'extrémité des tiges.
Toucher :	Plante velue.
Goût :	« Plante de saveur très amère ¹²³ ».

¹²² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.152-153.

¹²³ *Ibid.*



Thymus vulgaris

Thym

Fig. 93: BANTA, Nathaniel Moore, SCHNEIDER, Albert, HIGLEY, William Kerr, ABBOTT, Gerard Alan, 1914.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mars à août
Période de récolte :	Janvier à décembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Faible
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Modérée

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante d'odeur aromatique.
Vue :	Petites fleurs rosées ou blanchâtres. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ¹²⁴ .
Goût :	Plante de saveur aromatique.

Note

Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme condiment.



Trifolium repens

Trèfle rampant

Fig. 94: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ¹²⁵ .
Toucher :	Plante formant un tapis moelleux sous la voûte plantaire ¹²⁶ .
Goût :	« Feuilles de saveur douce et agréable, fleurs sucrées ¹²⁷ ».


Note

Les feuilles peuvent être consommées crues ou cuites. Les fleurs peuvent être ajoutées aux salades.

¹²⁵ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*

¹²⁶ Focus sur le jardin sensoriel, 2017. *op. cit.*

¹²⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* pp.202-203.



Vaccinium myrtillus

Myrtille

Fig. 95: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.6 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Avril à septembre
Période de récolte :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs d'un blanc verdâtre et rosé. Fruits globuleux d'un noir bleuté. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère.
Toucher :	Feuilles minces.
Goût :	« Fruits aromatiques et plus ou moins sucrés ¹²⁸ ».

Note

Les fruits peuvent être consommés crus ou cuits, en tarte ou en confiture.

¹²⁸ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.90.



Vaccinium vitis-idaea

Airelle rouge

Fig. 96: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.3 mètre
Croissance :	Lente
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mai à août
Période de récolte :	Juillet à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Fleurs blanches ou rosées réunies en petites grappes terminales. Fruits globuleux d'un rouge vif.
Toucher :	« Feuilles coriaces ¹²⁹ ».
Goût :	« Fruits acides et légèrement amers ¹³⁰ ».

Note

Les fruits se consomment crus ou cuits ; ils accompagnent parfaitement les viandes.

¹²⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.91.

¹³⁰ *Ibid.*



Vinca minor

Pervenche

Fig. 97: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Février à mai
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Ombre ou mi-ombre
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Feuilles d'un vert brillant. Grandes fleurs violettes.
Toucher :	« Plante glabre, feuilles coriaces ¹³¹ ».

¹³¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.171.



Viola odorata

Violette odorante

Fig. 98: (ci-contre) Die Gartenwelt, 1897.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Février à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Fleurs dégageant un parfum suave ¹³² ».
Vue :	Fleurs d'un violet intense.
Toucher :	« Plante légèrement velue ; feuilles de texture tendre ¹³³ ».

Note

Les feuilles peuvent être ajoutées aux salades.

¹³² COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.242.

¹³³ *Ibid.*



Viola tricolor

Pensée

Fig. 99: (ci-contre) MÜLLER, Walther Otto, Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1887.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.4 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Modéré
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles


Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs blanches, jaunes et violettes.
Toucher :	Plante légèrement velue.

Note

Les fleurs peuvent être consommées crues ou cuites. Elles peuvent être ajoutées aux salades.

Herbier

Plantes aquatiques



Althaea officinalis

Guimauve

Fig. 100: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Néophyte
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.2 mètres
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs d'un blanc rosé.
Toucher :	« Plante couverte de poils veloutés, très denses ¹³⁴ ».
Goût :	Plante de saveur agréable et sucrée.

¹³⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.246.



Eriophorum angustifolium

Linaigrette

Fig. 101: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN EEDEN, F.W., 1893.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.5 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Avril à août
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Importante
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ¹³⁵ .
Vue :	Fleurs blanches et duveteuses réunies en ombelle.
Toucher :	Plante cotonneuse au toucher.



Lythrum salicaria

Salicaire

Fig. 102: (ci-contre) KOPS, Jan, 1822.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.5 à 1.6 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Mai à juillet
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante


Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Grandes fleurs d'un rouge violacé groupées en longs épis terminaux. Présence de nombreux papillons attirés par le nectar de la plante mellifère ¹³⁶ .
Toucher :	Tiges et feuilles velues.

Note

Toutes les parties de la plante peuvent être consommées crues ou cuites.

¹³⁶ ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. *op. cit.*



Mentha aquatica

Menthe aquatique

Fig. 103: (ci-contre) KOPS, Jan, 1814.

Caractéristiques


Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.4 à 0.9 mètre
Croissance :	Normale
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juillet à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Mi-ombre ou soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Plante à forte odeur mentholée.
Vue :	Petites fleurs roses réunies en plusieurs groupes.
Toucher :	Plante légèrement velue.
Goût :	Plante à saveur mentholée et rafraichissante.

Note

Les feuilles peuvent être utilisées comme condiment.



Menyanthes trifoliata

Ményanthe

Fig. 104: (ci-contre) KÖHLER, Franz Eugen, 1897.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.3 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Avril à juin
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Vue :	Fleurs en étoiles, d'un blanc rosé féérique, à cinq pétales barbus.
Toucher :	« Plante glabre ¹³⁷ ».
Goût :	« Plante de saveur très amère ¹³⁸ ».

¹³⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.102.

¹³⁸ *Ibid.*



Nuphar lutea

Nénuphar jaune

Fig. 105: (ci-contre) KOPS, Jan, 1800.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	Fleurs légèrement odorantes.
Vue :	« Feuilles flottantes et fleurs portées au-dessus de l'eau ¹³⁹ ».
Toucher :	« Feuilles glabres, caoutchouteuses au toucher ¹⁴⁰ ».

¹³⁹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.100.

¹⁴⁰ *Ibid.*



Nymphaea alba

Nymphéa

Fig. 106: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1836.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.1 à 0.2 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bourdonnement d'abeilles et d'autres butineurs attirés par le nectar de la plante mellifère.
Odorat :	« Fleurs d'odeur suave ¹⁴¹ ».
Vue :	Feuilles et grandes fleurs blanches flottantes.
Toucher :	« Feuilles glabres, caoutchouteuses au toucher ¹⁴² ».

¹⁴¹ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.100.

¹⁴² *Ibid.*



Phragmites australis

Roseau

Fig. 107: (ci-contre) THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Semi-persistant
Période de floraison :	Juin à octobre
Besoin en entretien :	Normale
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ¹⁴³ .
Vue :	Minuscules fleurs groupées en épillets brunâtres.
Toucher :	« Feuilles à bords rudes ¹⁴⁴ ».

Note

Les jeunes pousses peuvent être consommées crues ou cuites.

¹⁴³ Focus sur le jardin sensoriel, 2017. *op. cit.*

¹⁴⁴ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.109.



Typha latifolia

Massette

Fig. 108: (ci-contre) MENTZ, August, 1917.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	1 à 2 mètres
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Caduc
Période de floraison :	Juin à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Ouïe :	Bruissement du feuillage au moindre souffle d'air ¹⁴⁵ .
Vue :	Minuscules fleurs brunâtres groupées en gros épi cylindrique dense.
Toucher :	« Feuilles glabres, épaisses, spongieuses ¹⁴⁶ ».

¹⁴⁵ Focus sur le jardin sensoriel, 2017. *op. cit.*

¹⁴⁶ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.108.



Veronica beccabunga

Véronique Beccabunga

Fig. 109: (ci-contre) KOPS, Jan, VAN HALL,
Herman Christiaan, 1832.

Caractéristiques

Indigénat :	Indigène
Hauteur à maturité :	0.2 à 0.6 mètre
Croissance :	Rapide
Type de végétation :	Vivace
Type de feuillage :	Persistant
Période de floraison :	Mai à septembre
Besoin en entretien :	Faible
Besoin en eau :	Important
Exposition :	Soleil
Rusticité :	Importante

Stimulations sensorielles

Vue :	Petites fleurs d'un bleu pâle groupées en longues grappes.
Toucher :	« Plante glabre, tiges et feuilles charnues ¹⁴⁷ ».
Goût :	« Plante de saveur amère et légèrement piquante ¹⁴⁸ ».

Note

Les feuilles et les tiges peuvent être ajoutées aux salades.

¹⁴⁷ COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *op. cit.* p.103.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Bibliographie et iconographie

Livres

COUPLAN, François, illustrations par DOUX, Yves. 2019. *Reconnaître facilement les plantes : identifier, toucher, sentir, goûter*. Paris : Delachaux et Niestlé. Nouvelle édition. Botanique.

ISBN 978-2-603-02676-2

FLEISCHHAUER, Steffen Guido, GUTHMANN, Jürgen, SPIELGELBERGER, Roland, 2018. *Plantes sauvages comestibles: les 50 plantes essentielles et leurs usages*. Vieilles racines & jeunes pousses. Paris : Ulmer.

ISBN 978-2-84138-907-0

KAMMER, Peter M., 2017. *Reconnaître pas à pas 700 plantes communes*. Paris : Delachaux et Niestlé.

ISBN 978-2-603-02523-9

LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain.

ISBN 978-2-86925-152-6

Sites internet

ANDERMATT BIOGARTEN, 2021. Les papillons au jardin. In : *Andermatt biogarten* [en ligne]. 1 avril 2021. [Consulté le 2 juillet 2022].

Disponible à l'adresse : <https://www.biogarten.ch/fr/biodiversite-papillons>

AUJARDIN.INFO, 2010. Encyclopédie des plantes. In : *aujardin.info* [en ligne]. 2 avril 2010. [Consulté le 2 juillet 2022].

Disponible à l'adresse : <https://www.aujardin.info/plantes/>

Focus sur le jardin sensoriel, 2017. In : *jardin-thérapeutique.net* [en ligne]. 8 juin 2017. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <http://www.jardin-therapeutique.net/jardin-therapeutique/realisation-recommandations/plantations-recommandations/focus-sur-le-jardin-sensoriel/>

GOMBAULT, C., MORISON N., GUILBAUD, L., VAISSIÈRE, BE, 2016. Résultats. In : *FlorAbeilles : Base de données en ligne sur les interactions plantes-abeilles en France métropolitaine*. Irae, Unité abeilles et environnement, Avignon, France. [en ligne]. 1 juin 2016. [Consulté le 2 juillet 2022].

Disponible à l'adresse : <http://www.florabeilles.org/stats>

INFO FLORA, 2022. Listes à télécharger. In : *Info flora* [en ligne]. 3 juin 2022. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <https://www.infoflora.ch/fr/donnees/listes-a-telecharger.html>

LANDESFORSTINVENTAR, INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL, INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE, ENVENTAI FORESTAL NAZIUNAL, NATIONAL FOREST INVENTORY, 2022. Cartes de la répartition observée de 94 espèces ligneuses. In : *lfi.ch* [en ligne]. 29 juin 2022. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : www.lfi.ch/resultate/baumarten/verbreitung2-fr.php?color=150%2C192%2C66

LE GUIDE DES PLANTATIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAIN, 2018. À la découverte des 622 plantes. In : *Le guide des plantations du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine* [en ligne]. 28 juin 2018. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <https://guidedesplantations.fr/plantation/>

OOREKA, 2016. Jardinage, le guide pratique. In : *Ooreka* [en ligne]. 28 avril 2016. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <https://jardinage.ooreka.fr/>

PROSPECIERARA, [s.d.]. La feuillée : sain et écologique. In : *ProSpecieRara* [en ligne]. [s.d.]. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/sinformer/sinformer-details/news/laubfuetterung-gesund-und-oekologisch.html>

STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, 2019. Un jardin pour les oiseaux. In : *vogelwarte.ch* [en ligne]. 27 mars 2019. [Consulté le 2 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : <https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/un-jardin-pour-les-oiseaux/un-jardin-pour-les-oiseaux>

Illustrations

Fig. 2 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.46. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 3 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.128. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 4 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.212. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 5 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.131. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 6 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.116. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 7 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.136. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 8 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.153. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 9 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.157. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 10 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.233. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 11 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.85. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 12 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.215. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 13 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.237. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 14 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.100. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 15 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.279. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 16 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.265. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 17 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.240. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 18 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.268. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 19 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.183. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 20 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.281. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 21 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.270. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 22 : LEONARDI, Cesare, STAGI, Franca, 2019. *L'architecture des arbres*. Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain. p.221. [reproduit avec l'aimable autorisation des Archives de l'architecte Cesare Leonardi]

Fig. 23 : KOPS, Jan, 1822. Flora Batava, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelica_sylvestris_%E2%80%94_Flora_Batava_%E2%80%94_Volume_v4_clean.jpg?uselang=fr

Fig. 24 : HOFFMAN, L., 1883. Anthriscus sylvestris. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthriscus_sylvestris_%28K%C3%B6hler%27s_Medizinal-Pflanzen%29.jpg?uselang=fr

Fig. 25 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Astragalus glycyphyllos. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Astragalus_glycyphyllos0.jpg

Fig. 26 : KOPS, Jan, 1822. Flora Batava, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinapis_nigra_—_Flora_Batava_—_Volume_v4.jpg

Fig. 27 : KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1898. Flora Batava. Afbeelding en beschrijving der Nederlandsche Gewassen. (1898). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calamintha_officinalis_—_Flora_Batava_—_Volume_v20.jpg

Fig. 28 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Calluna vulgaris*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Calluna_vulgaris0.jpg

Fig. 29 : KOPS, Jan, 1814. *Flora Batava*. Volume 3 (1814). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Convolvulus_sepium_-_Flora_Batava_-_Volume_v3.jpg

Fig. 30 : KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1877. *Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen*, XV. Deel. (1877). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campanula_rapunculus_-_Flora_Batava_-_Volume_v15.jpg

Fig. 31 : KOPS, Jan, 1822. *Flora Batava*, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carum_carvi_-_Flora_Batava_-_Volume_v4.jpg

Fig. 32 : LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1901. *Crise maraîcher, Chardon des potagers, Cirse faux épinard, Brancursine sauvage...* Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirsium_oleraceum_-_Billeder_af_nordens_flora_%281917%29_%2814782302024%29_-_clean.jpg

Fig. 33 : *Epilobium angustifolium*, [s.d.]. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleane-Illustration_Epilobium_angustifolium.jpg

Fig. 34 : KOPS, Jan, 1800. *Flora Batava*, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupatorium_cannabinum_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 35 : KOPS, Jan, HARTSEN, F. A., VAN EEDEN, F. W., 1868. *Flora Batava of Afbeeldingen en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen*, XIII. Deel. (1868). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiraea_ulmaria_-_Flora_Batava_-_Volume_v13.jpg

Fig. 36 : KÖHLER, Franz Eugen, Köhler's Mediziner-Pflanzen, 1897. Gelber Enzian. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentiana_lutea_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-066.jpg?uselang=fr

Fig. 37 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1905. Tafel 451. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heracleum_sphondylium_%28Thom%C3%A9_Bd.3_1905,_BHL-81509,_Tafel_451%29_clean.png

Fig. 38 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Humulus_lupulus0.jpg

Fig. 39 : MASCLEF, Amédée, 1891. Isatis tinctoria L., Atlas des plantes de France, 1891. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:38_Isatis_tinctoria_L.jpg?uselang=fr

Fig. 40 : KOPS, Jan, 1846. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, IX Deel. (1846). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lathyrus_sylvestris_-_Flora_Batava_-_Volume_v9.jpg

Fig. 41 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Lilium Martagon. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Lilium_martagon0_clean.jpg?uselang=fr

Fig. 42 : STURM, Johann Georg, 1796. Staudige Mondviole, Crucifera rediviva. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunaria_rediviva_Sturm18.jpg

Fig. 43 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malva_sylvestris_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 44 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Melilotus officinalis. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Melilotus_officinalis1.jpg

Fig. 45 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Orchis purpurea*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Orchis_purpurea0.jpg

Fig. 46 : KOPS, Jan, 1814. *Flora Batava*. Volume 3 (1814). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origanum_vulgare_-_Flora_Batava_-_Volume_v3.jpg

Fig. 47 : SMITH, Worthington George, 1863-1880. A Bath asparagus plant (*Ornithogalum pyrenaicum*): entire flowering plant in two sections. Coloured lithograph by W. G. Smith, c. 1863, after himself. Domaine public. In : *Wellcome collection* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : <https://wellcomecollection.org/works/a7tztvf6>

Fig. 48 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Phleum pratense*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Phleum_pratense0.jpg

Fig. 49 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Polygonum bistorta*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Polygonum_bistorta0.jpg?uselang=fr

Fig. 50 : REDOUTÉ, Pierre-Joseph, 1827. Red Currant from Choix des plus belles fleurs. Domaine public. In : *Rawpixel* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : <https://www.rawpixel.com/image/2870867/free-illustration-image-fruit-berry-butterfly>

Fig. 51 : KOPS, Jan, 1822. *Flora Batava*, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_pratensis_-_Flora_Batava_-_Volume_v4.jpg

Fig. 52 : KOPS, Jan, 1877. *Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen*, XV. Deel. (1877). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scirpus_sylvaticus_%E2%80%94_Flora_Batava_%E2%80%94_Volume_v15.jpg

Fig. 53 : KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1849. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, X Deel. (1849). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lychnis_dioica_-_Flora_Batava_-_Volume_v10.jpg

Fig. 54 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1905. Tafel 569. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_virgaurea_ssp_virgaurea_clean.jpg

Fig. 55 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1828. Flora Batava, Volume 5 (1828). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tragopogon_pratensis_-_Flora_Batava_-_Volume_v5.jpg

Fig. 56 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valeriana_officinalis_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 57 : KOPS, Jan, 1814. Verbascum thapsus L. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verbascum_thapsus_flora_batava.jpg

Fig. 58 : REICHENBACH, L., REICHENBACH, H. G., 1903. Vicia Cracca. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicia_cracca_%28Icones_Florae_Germanicae_et_Helveticae_1903,_v22,_plate_230%29_clean,_no-description.png

Fig. 59 : LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1917-1926. Daggkåpa, Alchemilla vulgaris L. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemilla_vulgaris_-_Billeder_af_nordens_flora_%281917,_plate_297%29_clean.jpg

Fig. 60 : KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1849. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, X Deel. (1849). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allium_schoenoprasium_-_Flora_Batava_-_Volume_v10.jpg

Fig. 61 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Allium ursinum* L. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Allium_ursinum1.jpg

Fig. 62 : KOPS, Jan, GEVERS DEIJNOOT, P. M. E., HARTSEN, F. A., 1865. *Flora Batava of Afbeeldingen en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen*, XII. Deel. (1865). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borago_officinalis_-_Flora_Batava_-_Volume_v12.jpg

Fig. 63 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Cardamine pratensis*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Cardamine_pratensis0.jpg

Fig. 64 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Chenopodium bonus-henricus*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Chenopodium_bonus-henricus0.jpg

Fig. 65 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832. *Flora Batava*, Volume 6 (1832). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocus_vernus_-_Flora_Batava_-_Volume_v6.jpg

Fig. 66 : KOPS, Jan, 1807. *Flora Batava*, Volume 2 (1807). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antirrhinum_cymbalaria_-_Flora_Batava_-_Volume_v2.jpg

Fig. 67 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1836. *Flora Batava*, Volume 7 (1830). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchis_maculata_-_Flora_Batava_-_Volume_v7.jpg

Fig. 68 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Fragaria vesca*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Fragaria_vesca0.jpg

Fig. 69 : STURM, Johann Georg, 1796. Echter Waldmeister, *Galium matrisilva*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galium_odoratum_Sturm47.jpg?uselang=fr

Fig. 70 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galium_verum_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 71 : KOPS, Jan, 1807. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthus_non-scriptus_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 72 : STURM, Johann Georg, 1796. Goldnessel, *Lamium galeobdolon*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamium_galeobdolon_Sturm40.jpg

Fig. 73 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Lavandula angustifolia*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Lavandula_angustifolia0.jpg

Fig. 74 : DENNERT, E., 1911. Hoffmann-Dennert botanischer Bilderatlas, nach dem natürlichen Pflanzensystem. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoffmann-Dennert_botanischer_Bilderatlas_%28Taf._63%29_%286425015037%29.jpg

Fig. 75 : KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1877. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, XV. Deel. (1877). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mentha_arvensis_-_Flora_Batava_-_Volume_v15.jpg

Fig. 76 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1828. Flora Batava, Volume 5 (1828). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthus_botryoides_-_Flora_Batava_-_Volume_v5.jpg

Fig. 77 : CORREVON, Henry, 1899. Album des orchidées de l'Europe centrale et septentrionale. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Album_des_orchidées_de_l%27Europe_centrale_et_septentrionale_\(1899\)_\(17946314572\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Album_des_orchidées_de_l%27Europe_centrale_et_septentrionale_(1899)_(17946314572).jpg)

Fig. 78 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxalis_acetosella_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 79 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Phyteuma spicatum*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Phyteuma_spicatum0.jpg

Fig. 80 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Plantago major*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Plantago_major0_clean.jpg

Fig. 81 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Potentilla anserina*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Potentilla_anserina0.jpg

Fig. 82 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Primula veris*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Primula_veris0_clean.jpg

Fig. 83 : KOPS, Jan, VAN EEDEN, F. W., 1872. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, (1872). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primula_acaulis_-_Flora_Batava_-_Volume_v14.jpg

Fig. 84 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. *Pulmonaria officinalis*. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Pulmonaria_officinalis0.jpg

Fig. 85 : KOPS, Jan, VAN DER TRAPPEN, Johannes Everhardus, 1846. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, IX Deel. (1846). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reseda_lutea_-_Flora_Batava_-_Volume_v9.jpg

Fig. 86 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Petite pimprenelle. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Sanguisorba_minor0.jpg

Fig. 87 : STURM, Jacob, 1849. Satureja montana L. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satureja_montana_-_Deutschlands_flora_in_abbildungen_nach_der_natur_-_vol._20_-_t._17.jpg

Fig. 88 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Sempervivum tectorum L. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Sempervivum_tectorum0.jpg

Fig. 89 : KOPS, Jan, GEVERS DEIJNOOT, P. M. E., 1853. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, XI. Deel. (1853). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silene_inflata_-_Flora_Batava_-_Volume_v11.jpg

Fig. 90 : MENTZ, August, 1917. Stellaire, Mouron des oiseaux, Mouron blanc, Morgeline. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stellaria_media_-_Billeder_af_nordens_flora_%281917%29_%2819750123373%29.jpg

Fig. 91 : LINDMAN, Carl Axel Magnus, 1901. Billeder af Nordens flora. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billeder_af_Nordens_flora_\(1901\)_ \(20344731676\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billeder_af_Nordens_flora_(1901)_ (20344731676).jpg)

Fig. 92 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teucrium_scorodonia_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 93 : BANTA, Nathaniel Moore, SCHNEIDER, Albert, HIGLEY, William Kerr, ABBOTT, Gerard Alan, 1914. 325 Thyme. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nature_neighbors,_embracing_birds,_plants,_animals,_minerals,_in_natural_colors_by_color_photography,_containing_articles_by_Gerald_Alان_Abbott,_Dr._Albert_Schneider,_William_Kerr_Higley...and_other_\(14771814823\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nature_neighbors,_embracing_birds,_plants,_animals,_minerals,_in_natural_colors_by_color_photography,_containing_articles_by_Gerald_Alان_Abbott,_Dr._Albert_Schneider,_William_Kerr_Higley...and_other_(14771814823).jpg)

Fig. 94 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Trifolium repens. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Trifolium_repens0.jpg

Fig. 95 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Vaccinium vitis-idaea and Vaccinium myrtillus. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Vaccinium_myrtillus0.jpg

Fig. 96 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832. Flora Batava, Volume 6 (1832). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaccinium_vitis-idaea_-_Flora_Batava_-_Volume_v6.jpg

Fig. 97 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832. Flora Batava, Volume 6 (1832). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinca_minor_-_Flora_Batava_-_Volume_v6.jpg

Fig. 98 : Die Gartenwelt, 1897. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenwelt_\(1899\)_\(20732539149\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenwelt_(1899)_(20732539149).jpg)

Fig. 99 : MÜLLER, Walther Otto, Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1887. Viola tricolor. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_tricolor_-_Köhler-s_Medizinal-Pflanzen-280.jpg

Fig. 100 : KOPS, Jan, 1822. Flora Batava, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Althaea_officinalis_-_Flora_Batava_-_Volume_v4.jpg

Fig. 101 : KOPS, Jan, VAN EEDEN, F.W., 1893. Flora Batava. Afbeelding en beschrijving der Nederlandsche Gewassen. (1893). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eriophorum_angustifolium_-_Flora_Batava_-_Volume_v19.jpg

Fig. 102 : KOPS, Jan, 1822. Flora Batava, Volume 4 (1822). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lythrum_salicaria_-_Flora_Batava_-_Volume_v4.jpg

Fig. 103 : KOPS, Jan, 1814. Flora Batava. Volume 3 (1814). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mentha_aquatica_-_Flora_Batava_-_Volume_v3.jpg

Fig. 104 : KÖHLER, Franz Eugen, 1897. Menyanthes trifoliata. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menyanthes_trifoliata_-_Köhler-s_Medizinal-Pflanzen-225.jpg

Fig. 105 : KOPS, Jan, 1800. Flora Batava, Volume 1 (1800). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuphar_lutea_-_Flora_Batava_-_Volume_v1.jpg

Fig. 106 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1836. Flora Batava, Volume 7 (1830). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymphaea_alba_-_Flora_Batava_-_Volume_v7.jpg

Fig. 107 : THOMÉ, Otto Wilhelm, 1885. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Phragmites_australis0.jpg

Fig. 108 : MENTZ, August, 1917. Billeder af nordens flora. Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billeder_af_nordens_flora_\(1917\)_-\(19750597673\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billeder_af_nordens_flora_(1917)_-(19750597673).jpg)

Fig. 109 : KOPS, Jan, VAN HALL, Herman Christiaan, 1832. Flora Batava, Volume 6 (1832). Domaine public. In : *Wikimedia Commons* [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2022].

Disponible à l'adresse : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronica_beccabunga_-_Flora_Batava_-_Volume_v6.jpg

Autres figures : BLANK, Alison, COSSALI, Kilian.

